

CONHECIMENTO DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS CUIDADOS COM A SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS

TÂMARA PESSOA OLIVEIRA TAGLIATTI; LUANA VIVIAN MOREIRA; YASMIN FERREIRA CARVALHO; ANANDA TATIELLE DA SILVA VAL; BEATRIZ LIMA RIBEIRO; RAPHAELA SILVEIRA SIMÕES RICALDONI; FERNANDA BARTOLOMEO FREIRE MAIA; IZABELLA BARBOSA FERNANDES
dratamaratagliatti@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

INTRODUÇÃO:

A cária na primeira infância (CPI), uma das doenças mais prevalentes entre crianças (OMS, 2022), afeta a saúde e a qualidade de vida. É fundamental avaliar se as orientações de prevenção e promoção de saúde bucal alcançam os pais, principais responsáveis pelo cuidado bucal das crianças.

OBJETIVO:

O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento dos pais em relação aos cuidados com a saúde bucal de crianças.

METODOLOGIA:



1. Afirmativas
Devemos levar a criança ao dentista antes do nascimento do primeiro dente de leite.
2. Cária em dente de leite não precisa ser tratada já que esse dente será substituído por um dente permanente.
3. Só posso oferecer alimentos contendo açúcar para criança a partir dos dois anos de idade.
4. O tratamento de canal não é indicado para dentes de leite.
5. Devo usar a pasta de dente com flúor a partir do nascimento do primeiro dente da criança.

Resposta certa = 1 ponto
Total ≤ 3 pontos = escore baixo
Total > 3 pontos = escore alto



193 pais/responsáveis;
Crianças de 0 a 12 anos de
idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Tabela 1: Questões de conhecimento

| Questões | Errado | % | Certo | % |
|--|--------|------|-------|------|
| Devemos levar a criança ao dentista | 71 | 36,8 | 122 | 63,2 |
| Cária no dente de leite não precisa... | 7 | 3,6 | 186 | 96,4 |
| Só posso oferecer alimento... | 29 | 15 | 164 | 85 |
| O tratamento de canal não é... | 77 | 39,6 | 116 | 60,4 |
| Devo usar pasta de dente com flúor | 86 | 44,6 | 107 | 55,4 |

Tabela 2: Associações entre as variáveis independentes e o escore total da escala de conhecimento em saúde bucal.

| Variável | RP (IC 95%) | p-valor |
|--|------------------|---------|
| Sexo feminino | 1,10 (1,01-1,22) | 0,041 |
| Idade 22-38 anos | 1,12 (1,04-1,20) | 0,003 |
| Raça branca/amarela/índigena | 1,09 (1,01-1,18) | 0,033 |
| Dentista antes do 1º dente | 1,43 (1,08-1,23) | <0,001 |
| Acompanhamento pediátrico nos 12 primeiros meses | 1,19 (1,07-1,23) | 0,002 |

*Ajustado para: Sexo, idade, raça, renda, pré-natal odontológico, pré-natal médico, consulta da criança ao dentista.

- Média nível de conhecimento: 3,6/5 pontos

CONCLUSÃO:

O conhecimento dos pais sobre cuidados com a saúde bucal infantil foi alto e esteve associado a características sociodemográficas e acesso à saúde bucal precoce.

REFERÊNCIAS:

